



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா  
இந்திய வானிலை துறை  
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்  
கோவை, தமிழ்நாடு



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-04-2024

தி -நீல்கிரிஸ்(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-04-23 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-04-24	2024-04-25	2024-04-26	2024-04-27	2024-04-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	26.0	27.0	26.0	26.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	14.0	14.0	15.0	14.0	14.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	80	60	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	20	20	20	20	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4	6	4	6	4
காற்றின் திசை (கோணம்)	140	110	140	160	160
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	6	4	2	3

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இருந்து பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு மிக லேசான மழையும், அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 26- 27°செஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 14-15°செஆகவும் இருக்கக்கூடும். காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 60-80 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 20-30 சதவிகிதமாகவும் இருக்கக்கூடும்.சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 04-06 கி.மீஅளவுக்கு வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

விதைகளை ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடு @ 4 கிராம்/கிலோ அல்லது பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் @ 10 கிராம்/கிலோ கொண்டு விதை மற்றும் மண் மூலம் பரவும் நோய்க்கிருமிகளை கட்டுப்பாடுத்த விதை நேர்த்தி செய்யலாம். மேலும், எந்தவொரு பயிர் திட்டத்திற்கும் முன்பு மண் பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி:

பாகற்காயில் அசுவினி மற்றும் தத்துப்பூச்சி நிர்வகிக்க, இமிடாக்ளோபிரிட் 70 WG 1.0g/10lit இலைகளில் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
முள்ளங்கி	கேரட்டில் நூற்புழு மேலாண்மைக்கு, நடவு செய்யும் போது எக்டருக்கு 1 டன் வேப்பம் பிண்ணாக்கு மண்ணில் இடவும். கடுகு செடிகளை உயிரி புகையாக்குதல் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்கு ஒரு ஹெக்டருக்கு 250 கிலோ இடுதல், பர்ப்யூரோசிலியம் லிலாசினம் @ 5 கிலோ/எக்டருக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
உருளைக்கிழங்கு	உருளைக்கிழங்கு பயிரில் ஏற்படும் இலை கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த, நடவு செய்த 45, 60 மற்றும் 75 நாட்களில், ஹெக்ஸ்கோனசோல் 2% எஸ்சி @ 0.06% அல்லது மான்கோசெப் @ 2 கிராம்/லி ஆர்க்ளோரோதலோனில் @ 2 கிராம்/லி ஆகியவற்றை இலைவழி தெளிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
தேயிலை	தேயிலை பயிரில் சிலந்திப் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த, அசாடிராக்டின் 1.0% இசி (வேம்பு அடிப்படையிலானது) 2.0 மிலி/லிட் அல்லது புரோபார்கைட்டு 57% இசி 2.0 மிலி/லிட் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
செங்கிழங்கு	பீட்ரூட் பயிரில் இலைப்புள்ளி நோயை கட்டுப்படுத்த, நடவு செய்த 45, 60 மற்றும் 75 நாட்களில் மான்கோசெப் @ 2 கிராம்/லி இலைகளில் தெளிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.